



Christopher A. Swisher, DDS  
Pediatric Dentistry

### **Instrucciones del Cuidado en Casa de Corona (Casquillo)**

A veces, la restauración dental de elección para los niños es una corona (casquillo). Una restauración de corona rodea y cubre todas las superficies del diente de su hijo. Una corona generalmente es la mejor restauración que se puede proporcionar a su hijo. Le proporcionamos algunas instrucciones sobre cómo cuidar este tipo de restauración dental a fin de mantener una dentadura saludable y funcional para su hijo.

El tejido de las encías que rodea la corona de su hijo puede estar rojo, inflamado, sangrar fácilmente y dolorido inmediatamente después de la colocación de la corona. Esto es normal en este momento y puede persistir durante 7-10 días después de la colocación de la corona. Mantenga el área limpia cepillando y usando el hilo dental con regularidad. El material blanquecino (placa dental) debe eliminarse con el cepillado. Las encías pueden sangrar inicialmente. Esto es normal, y el cepillado no debe suspenderse si esto ocurre. Si el material blanquecino (placa) se deja en cualquier superficie de la corona causará inflamación (infección) en las encías.

Mientras que las coronas son una de las restauraciones más fuertes, nada es más fuerte que un diente natural sin caries. Las coronas no son capaces de resistir la presión que se hace al morder artículos tales como el plástico, madera o metal. Evite que su hijo muerda este tipo de artículos. Las coronas tampoco resistirán el trauma causado por una caída o un golpe en la cara y/o la dentición.

Las coronas están pegadas o cementadas al diente existente. Este pegamento o cemento es fuerte, pero si comen cosas duras, chiclosas, o pegajosas, la corona puede despegarse. Para evitar que esto ocurra, se recomienda que evite los siguientes alimentos: Gummy Bears, Jolly Ranchers, Dulces duros o chiclosos, Taffy, Chiclos, Caramelos, Paletas, Fruit Roll-Ups, Corn Nuts, Jerky (Carne Seca), Zanahorias crudas o hielo.

Los dientes de leche (primarios) con restauraciones de coronas se perderán del mismo modo que los otros dientes se pierden, cuando la raíz se disuelve lo suficiente al ser reemplazada por el diente permanente. No hay ninguna preocupación en especial en el momento de que un diente de leche con corona se pierde debido a la erupción de un diente permanente.

Si su hijo rechina (muele) excesivamente sus dientes, se puede hacer un agujero en la corona que podría causar caries y/o la pérdida de la corona. Si nota un agujero en la corona de su hijo, avísele al dentista.

Si la corona de su hijo está floja o se ha caído, llame a la oficina de inmediato. Muchas veces, una suelta corona puede ser re-cementada (pegada), si su hijo es tratado de inmediato. Si la corona de su hijo se le ha caído, guárdela en una bolsa de plástico y llame a la oficina de inmediato. El retraso en tratamiento podría conducir a la necesidad de una nueva corona, caries o pérdida del diente.