



1615 Woods Court, Hood River, Oregon  
Teléfono (541) 490-4993 Fax (541) 436-4418  
[info@littleshredders.com](mailto:info@littleshredders.com) [www.littleshreddersdental.com](http://www.littleshreddersdental.com)

Christopher A. Swisher, DDS

Odontología Pediátrica

#### INSTRUCCIONES POSTERIORES A LA COLOCACIÓN DE CORONAS DE ACERO INOXIDABLE EN NIÑOS

Hoy se colocó una corona de acero inoxidable en uno o más de los dientes de su hijo/a. La indicación para el uso de coronas sobre los empastes dentales convencionales determina que cuando se elimina la caries principal, es necesario proteger todo el diente contra las quebraduras que se producen al masticar. Es posible que una corona de acero inoxidable si pueda hacerlo.

Una vez que se coloque una corona de acero inoxidable en un diente de leche, el diente aún podrá exfoliar (caerse) al igual que un diente normal sin corona.

1. Se usó anestesia local; así que por favor siga nuestras instrucciones de "Instrucciones para atención de la anestesia local en niños."
2. Su hijo/a debe mantener una dieta blanda durante el resto del día.
3. Es posible que las encías estén rojas y adoloridas después de la colocación de la corona. Esto es normal y debe mejorar dentro de una semana. Mantenga el área limpia con el cepillo y el hilo dental. Se debe cepillar para eliminar el material blancuzco (placa dental). Las encías pueden sangrar inicialmente. Esto es normal y suele suceder, sin embargo no debe interrumpirse el cepillado. Si este material blancuzco (placa) queda en los costados de la corona, producirá la inflamación de las encías (infección).
4. Es posible que su hijo/a describa que siente diferente el diente donde la corona fue colocada. Por favor, dele tiempo para que su hijo/a se acostumbre a esta sensación. Es posible que al principio su hijo/a tenga sensibilidad al consumir alimento o líquidos calientes o frío. Esto disminuirá después de unas cuantas semanas a medida de que el diente se aclimate a la nueva corona.

Evite que su hijo/a consuma dulces pegajosos, chicles, etc. Estos podrían debilitar el cemento adhesivo que se utilizó para colocar permanente la corona sobre el diente preparado. Si la corona se despegó, guárdela y llame a nuestra oficina. No espere demasiado tiempo ya que el diente sin la corona puede moverse dentro de la boca y pueda ser necesario volver a preparar el diente para colocar una nueva corona; si una corona se mantiene fuera del diente por un tiempo prolongado, puede resultar en la pérdida del diente. Por lo general, si encuentra la corona y se hace una cita para volver a cementarla sin demoras, la re-cementación fácilmente puede llevarse a cabo sin necesidad de usar anestesia local. Puede haber un cargo adicional para volver a cementar una corona que se ha despegado o para volver a preparar el diente para una nueva corona.